

Prestop®

För bekämpning av sjukdomar på lökväxter

Prestop® är ett biologiskt växtskyddsmedel vars effekt baserar sig på den noggrant utvalda och testade verksamma mikroben *Gliocladium catenulatum* J1446 som har isolerats ur finländsk åkerjord. På lökväxter bekämpar Prestop både markburna svampsjukdomar och svampsjukdomar som sprids med sättlök (*Fusarium*, *Botrytis*). Prestop-behandlingen kan utföras i lökväxternas plantuppdragningsstadium, som doppningsbehandling av sättlökar eller vitlöksklyftor eller som radbesprutning på friland och i tunnel efter planteringen. Prestop lämpar sig också för ekoproduktion.




Sättlök och vitlöksklyftor (Minor Use): Behandlingen görs genom att snabbt doppa sättlökarna eller vitlöksklyftorna i en 0,5 % Prestop-vattenblandning. Låt förökningsmaterialet torka före planteringen. Plantuppdragning: Vid bevattning av sådd och småplantor med Prestop är bruksmängden 5-10 g/m². För bevattning används 0,5 % Prestop-vattenblandning 1-2 liter/m² eller också kan vattenmängden regleras enligt bevattningsbehovet. Bevattningsbehandlingen kan upprepas strax före utplanteringen på friland så att Prestop skyddar mot svampsjukdomar också på friland.

Behandling efter plantering (Minor Use): Lökväxterna kan behandlas som radbesprutning genast efter det att sättlökarna eller plantorna har blivit planterade. Vid behov kan behandlingen upprepas 3-6 veckor efter planteringen. Bruksmängden vid tunnelodling är 2-3 kg/ha och på friland 3-4 kg/ha. Besprutningen utförs med 0,5 % vattenblandning, i tunnel 400-600 l/ha och på friland 600-800 l/ha. Alternativt kan man reglera vattenmängden enligt vilken besprutningsutrustning som används.


Gör Prestop-vattenblandningen så här: Blanda Prestop-pulvret till först i en liten mängd kallt vatten (1 kg/10-20 liter) och låt blandningen stå i 15-30 minuter. Rör om vattenblandningen omsorgsfullt tills allt pulver har löst sig och späda ut till den slutliga brukskoncentrationen.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Prestop finns att få i förpackningar om 100 g och 1 kg. Produkten är hållbar 12 månader i oöppnad förpackning om den förvaras svalt, under +8° C.



Prestop-radbesprutning genast efter planteringen ökade rödlökens färskvikt vid tunnelodling. Observationerna gjordes 6 veckor efter planteringen av sättlökarna.



Prestop-besprutningsbehandling vid bekämpning av *Fusarium*- och *Botrytis*-svampar på rödlök.