



Biologisten valmisteiden
KÄYTTÖOHJELMA
ESIMERKKI

Verdera

SALAATIT JA YRTIT

TAIMIKASVATUS

KOURUIHIN SIIRTÄMISEN JÄLKEEN

KASVUALUSTAN KÄSITTELY

TAIMIPOLTE JA JUURISTOTAUDIT

HARMAAHOME (*Botrytis*)

JUURISTO- TAUDIT

STRESSITEKIJÖIDEN HALLINTA

PRESTOP® MIX

MYCOSTOP®

Pääongelmana *Fusarium*

LALSTOP® G46 WG

Pääongelmana *Pythium* tai
Rhizoctonia

LALSTOP® G46 WG

MYCOSTOP®

LALSTIM® OSO

Sekoita kasvualustaan
ennen kylvöä ¹⁾

Peittää siemenet ennen kylvöä tai
kastele/ruiskuta kasvualusta
taimettumisen jälkeen

Kastele tai ruiskuta
kasvualusta kylvön jälkeen

Ruiskuta kasvit
taimettumisvaiheessa,
toista tarvittaessa 3–4
viikon välein

Lisää vesiseos
kiertoveteen,
toista 1–2 viikon
välein

Käsittely 24 h ennen
stressiolosuhteita

KASVUALUSTASEKOITUS

300–500 g/m³ turvetta

SIEMENTEN PEITTAUS

2–8 g/kg
siemeniä

PIKKUTAIMIEN KASTELU ²⁾

2–10 g/100 m²

KYLVÖSTEN TAI PIKKUTAIMIEN KASTELU ²⁾

50–100 g/100 m²

LEHVÄSTÖRUISKUTUS

Esim. 0,05 % vesiseos
(10 g/20 l vettä)

LISÄYS KIERTOVETEEN

1 g/1000 kasvia

LEHVÄSTÖRUISKUTUS

6 g/l

1) Ennen kylvöä kasvualustaan sekoitus vesiliuksena tai jauheena, minkä jälkeen huolellinen sekoitus

2) Vesimäärä voidaan säätää kasvualustan kosteuden ja kastelutarpeen mukaisesti

Eri mikrobiuotteilla tehtävien kasvualustakäsittelyiden välille suositellaan 1 viikon väliaikaa

Lisätietoja yhteensopivuudesta valmistajalta ja myyjiltä: www.verdera.fi

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.

LALLEMAND
LALLEMAND PLANT CARE