



KASVIHUONE- JA TUNNELIMANSIKKA

ISTUTUS	ISTUTUKSEN JÄLKEEN	KUKINNAN AIKANA		
JUURISTOTAUTIEN TORJUNTA	JUURISTON STIMULOINTI, KASVUN EDISTÄMINEN	HARMAAHOME (<i>Botrytis</i>)		STRESSITEKIJÖIDEN HALLINTA, RAVINTEIDEN KIERRON PARANTAMINEN
LALSTOP® G46 WG <i>Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Phytophthora</i>	LALRISE® VITA	PRESTOP® MIX	LALSTOP® G46 WG	LALSTIM® OSMO
Käsittele istutuksen yhteydessä, toistetaan kastelukäsittelynä 4 viikon kuluttua	Ensimmäinen käsittely 1–2 viikkoa istutuksesta, toistetaan 4 viikon välein	Käsittely aloitetaan, kukinnan alusta alkaen	Kukinnan alusta alkaen, toistetaan 6–7 vrk välein	Käsittely 24 h ennen stressiolosuhteita
KASVUALUSTAN SEKOITUS ¹⁾ 20–50 g/m ³ PALJASJUURISTEN TAIMIEN UPOTUS ²⁾ 0,05 % vesiseos KENNOTAIMIEN KASTELU ³⁾ 12,5 g/1000 tainta KASTELU/TIPPUKASTELU ³⁾ 20–25 g/1000 kasvia	KASTELUN MUKANA ³⁾ 200 g/1000 kasvia	PÖLYTTÄJÄLEVITYS ⁴⁾ 300–500 g/ha kukinnan aikana Levittimiin lisätään <u>ohut</u> kerros jauhetta päivittäin tai tarpeen mukaan	KASVUSTON RUISKUTUS ⁵⁾ 250–300 g/ha (Ruiskutusvolyymi 500–1000 l/ha)	LEHVÄSTÖRUISKUTUS ⁵⁾ 2–4 kg /ha (Ruiskutusvolyymi 250–1000 l/ha)

1) Kasvualustan sekoitus vesiseoksena, vesimäärää voidaan säätää kasvualustan kosteuden mukaan.

2) Upota taimet LALSTOP G46 WG-vesiliuokseen siten, että juuret ja kasvupiste kastuvat kauttaaltaan. 200 l 0,05 % vesiliuosta riittää n. 10 000 frigotaimen upotukseen.

3) Vesimäärää voidaan säätää kasvualustan kosteuden ja kastelutarpeen mukaan.

4) Prestop Mix levitetään pölyttäjien avulla. Levitykseen riittää 2 levittimellä varustettua mehiläispesää hehtaarilla. Kasvihuoneissa/tunneleissa 1–2 kimalaispesää/1000 m².

5) LALSTOP G46 WG ja LALSTIM OSMO voidaan ruiskuttaa samassa seoksessa.

Lisätietoja yhteensopivuudesta valmistajalta ja myyjiltä: www.verdera.fi

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.