



Biologisten valmisteiden
KÄYTTÖOHJELMA
ESIMERKKI



HEDELMÄPUUT

Verdera

ISTUTUSKÄSITTELY JUURISTOALUEELLE		KUKINNAN AIKAAN			SATOKAUDEN ULKOPUOLELLA
KASVUUNLÄHDÖN JA JUURTUMISEN EDISTÄMINEN SEKÄ RAVINTEIDEN OTON PARANTAMINEN		OMENAN SIEMENKOTAMÄDÄN JA MUIDEN VARASTOTAUTIEIN TORJUNTA <i>Botrytis, Fusarium</i>	HALLAVAUROIIDEN ENNALTAEHKÄISY	SADON LAADUN PARANTAMINEN	KEVÄÄLLÄ/SYKSYLLÄ OMENAN HEDELMÄSYÖVÄN TORJUNTA <i>Neonectria</i>
LALRISE® VITA	LALRISE® MAX WP	PRESTOP MIX®	LALSTIM® OSMO		LALSTOP® G46 WG
Ensimmäinen käsittely istutuksen yhteydessä, toista käsittely 1kk välein.	Käsittely istutuksen yhteydessä.	Levitetään pölyttäjien avulla koko kukinnan ajan.	Kukintavaiheessa, viimeistään 24 h ennen kylmiä lämpötiloja.	4 viikkoa ennen sadonkorjuuta.	Keväällä silmujen puhkeamisen aikaan. Syksyllä, kun lehdistä on pudonnut vähintään puolet.
KASTELUN MUKANA ¹⁾ 2 g / 1 litra vettä / puu	KASTELU TAI TIPPUKASTELU ¹⁾ 0,5–2,5 g/puu tai 0,5 kg–1 kg/ha	PÖLYTTÄJÄLEVITYS ²⁾ 300–500 g/ha kukinnan aikana. Levittimiin lisätään <u>ohut</u> kerros jauhetta päivittäin tai tarpeen mukaan.	KASVUSTON RUISKUTUS 5–7 kg/ha	KASVUSTON RUISKUTUS 4 kg/ha	KASVUSTON RUISKUTUS 300–500 g/ha

1) LALRISE VITA ja LALRISE MAX WP voidaan levittää yhtäaikaaisesti samassa tankkiseoksessa. Käyttömäärä käyttöohjelman mukaisesti.

2) Prestop Mix levitetään pölyttäjien avulla. Levitykseen vähintään 2 levittimellä varustettua mehiläispesää hehtaarilla.

Lisätietoja yhteensopivuudesta valmistajalta ja myyjiltä: www.verdera.fi

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.