



TAIMIKASVATUS	ISTUTUKSEN JÄLKEEN		
TAIMIPOLTE	JUURISTOTAUDIT	HARMAAHOME (<i>Botrytis</i>) TOMAATTISYÖPÄ (<i>Didymella</i>)	STRESSITEKIJÖIDEN HALLINTA, RAVINTEIDEN KIERRON EDISTÄMINEN
MYCOSTOP®	MYCOSTOP® <i>Fusarium, Pythium</i>	LALSTOP® G46 WG	LALSTIM® OSMO
Käsittele heti kylvön tai taimettumisen jälkeen	Ensimmäinen käsittely istutusvaiheessa, toista käsittelyt 4–6 viikon välein	Ensimmäinen käsittely istutuksen yhteydessä, toistetaan kolmen viikon välein	Ensimmäinen käsittely 24 h ennen stressiolosuhteita. Käsittely toistetaan tarvittaessa kolmen viikon välein
KASTELU TAI KASVUALUSTAN RUISKUTUS ¹⁾ 2–10 g/100 m ²	TIPPUKASTELU, KASVUALUSTAN KASTELU TAI RUISKUTUS ¹⁾ 5–8 g/1000 kasvia	KASVUSTON RUISKUTUS ²⁾ 250–500 g/ha (Ruiskutusvolyymi 500–2000 l/ha)	LEHVÄSTÖRUISKUTUS ²⁾ tai TIPPUKASTELU ¹⁾ (vain kivivilla- alustoissa) 2–3 kg/ha (Ruiskutusvolyymi 400–1000 l/ha)

1) Vesimäärä voidaan säätää kasvualustan kosteuden ja kastelutarpeen mukaisesti

2) LALSTIM® OSMO ja LALSTOP® G46 WG voidaan ruiskuttaa lehvästään samassa seoksessa.

LALSTIM® OSMO voidaan antaa kivivilla-alustalla tippukastelun kautta samanaikaisesti MYCOSTOPin ja LALSTOP® G46 WG:n kanssa.

Lisätietoja yhteensopivuudesta valmistajalta ja myyjiltä: www.verdera.fi

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.