



PISTOKKAAT JA KENNOTAIMET		RUUKUTUKSEN JÄLKEEN				
JUURISTOTAUTIEN TORJUNTA		STRESSITEKIJÖIDEN HALLINTA JA KASVUN STIMULOINTI	HARMAAHOME <i>(Botrytis)</i>	JUURISTOTAUTIEN TORJUNTA	STRESSITEKIJÖIDEN HALLINTA, RAVINTEIDEN KIERRON PARANTAMINEN	
LALSTOP® G46 WG		LALSTIM® OSMO	LALSTOP® G46 WG	MYCOSTOP® <i>Fusarium, Pythium</i>	LALSTOP® G46 WG <i>Pythium, Fusarium, Rhizoctonia, Phytophthora</i>	LALSTIM® OSMO
Kennotaimien/ pistokkaiden upotus ennen ruukutusta	Kasvualustaan sekoitus tai kylvösten/ kennotaimien kastelu	Ensimmäinen käsittely 24 h ennen stressiolosuhteita	Ensimmäinen käsittely ruukutuksen yhteydessä, toistetaan kolmen viikon välein	Ensimmäinen käsittely ruukutusvaiheessa, toista käsittelyt 4–6 viikon välein	Ensimmäinen käsittely 24 h ennen stressiolosuhteita	
UPOTUS ¹⁾ 0,05 % vesiseos (10 g/ 20 l vettä)	KASVUALUSTAAAN SEKOITUS 20–50 g/m ³ KASTELU ³⁾ 0,5–1 g/m ²	RUISKUTUS ²⁾ 6 g/l	KASVUSTON RUISKUTUS ²⁾ 250–500 g/ha (Ruiskutusvolyyymi 500–2000 l/ha)	KASTELU TAI ALTAKASTELU ³⁾ 5–8 g/1000 kasvia	KASTELU TAI ALTAKASTELU ³⁾ Ruukkukoon mukaan, 2–50 g/1000 kasvia	LEHVÄSTÖRUISKUTUS ²⁾ 6 g/l

1) Upota kennotaimet nopeasti LALSTOP® G46 WG -vesiseokseen siten, että taimet kasvavat kauttaaltaan, ei tarvitse liottaa.

2) LALSTOP® G46 WG ja LALSTIM® OSMO voidaan ruiskuttaa tankkiseoksena

3) Vesimäärä voidaan säätää kasvualustan kosteuden ja kastelutarpeen mukaisesti

Lisätietoja yhteensopivuudesta valmistajalta ja myyjiltä: www.verdera.fi

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.