

# Prestop®

## För bekämpning av sjukdomar på lökväxter

Prestop® är ett biologiskt växtskyddsmedel vars effekt baserar sig på den noggrant utvalda och testade verksamma mikroben *Clonostachys rosea* J1446 som har isolerats ur finländsk åkerjord. På lökväxter bekämpar Prestop både markburna svampsjukdomar och svampsjukdomar som sprids med sättlök (*Fusarium*, *Botrytis*). Prestop-behandlingen kan utföras i lökväxternas plantuppdragningsstadium, som doppningsbehandling av sättlökar eller vitlöksklyftor eller som radbesprutning på friland och i tunnel efter planteringen. Prestop lämpar sig också för ekoproduktion.




**Sättlök och vitlöksklyftor (Minor Use):** Behandlingen görs genom att snabbt doppa sättlökarna eller vitlöksklyftorna i en 0,5 % Prestop-vattenblandning. Låt förökningsmaterialet torka före planteringen. Plantuppdragnings: Vid bevattning av sådd och småplantor med Prestop är bruksmängden 5-10 g/m<sup>2</sup>. För bevattning används 0,5 % Prestop-vattenblandning 1-2 liter/m<sup>2</sup> eller också kan vattenmängden regleras enligt bevattningsbehovet. Bevattningsbehandlingen kan upprepas strax före utplanteringen på friland så att Prestop skyddar mot svampsjukdomar också på friland.

**Behandling efter plantering (Minor Use):** Lökväxterna kan behandlas som radbesprutning genast efter det att sättlökarna eller plantorna har blivit planterade. Vid behov kan behandlingen upprepas 3-6 veckor efter planteringen. Bruksmängden vid tunnelodling är 2-3 kg/ha och på friland 3-4 kg/ha. Besprutningen utförs med 0,5 % vattenblandning, i tunnel 400-600 l/ha och på friland 600-800 l/ha. Alternativt kan man reglera vattenmängden enligt vilken besprutningsutrustning som används.

**Gör Prestop-vattenblandningen så här:** Blanda Prestop-pulvret till först i en liten mängd kallt vatten (1 kg/10-20 liter) och låt blandningen stå i 15-30 minuter. Rör om vattenblandningen omsorgsfullt tills allt pulver har löst sig och späda ut till den slutliga brukskoncentrationen.

**Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.**

Prestop finns att få i förpackningar om 100 g och 1 kg. Produkten är hållbar 12 månader i oöppnad förpackning om den förvaras svalt, under +4° C.



Prestop-radbesprutning genast efter planteringen ökade rödlökens färskvikt vid tunnelodling. Observationerna gjordes 6 veckor efter planteringen av sättlökarna.



Prestop-besprutningsbehandling vid bekämpning av *Fusarium*- och *Botrytis*-svampar på rödlök.