



ANVÄNDNINGSPROGRAM
för biologiska preparat
EXEMPEL



FRUKTTRÄD

Verdera

BEHANDLING AV ROTEN VID PLANTERING		VID BLOMNING			UTANFÖR SKÖRDETIDEN
FRÄMJAR TILLVÄXTEN OCH BILDANDET AV RÖTTER SAMT EFFEKTIVERAR NÄRINGSUPPTAGNINGEN		BEKÄMPNING AV KÄRNHUSRÖTA OCH ANDRA LAGRINGSJUKDOMAR <i>Botrytis, Fusarium</i>	FÖREBYGGANDE AV FROSTSKADOR	FÖRBÄTTRING AV SKÖRDENS KVALITET	BEKÄMPNING AV FRUKTTRÄDSKRÄFTA PÅ VÅR/HÖSTEN <i>Neonectria</i>
LALRISE® VITA	LALRISE® MAX WP	PRESTOP MIX®	LALSTIM® OSMO		LALSTOP® G46 WG
Behandla vid plantering, upprepa med 4 veckors mellanrum.	Behandla vid plantering.	Sprids med bin eller humlor under hela blomningsperioden.	Vid blomning, senast 24 h före kalla temperaturer.	4 veckor före skörd.	På våren när knopparna spricker ut. På hösten när åtminstone hälften av bladen har fallit.
MED BEVATTNING ¹⁾ 2 g / 1 liter vatten / träd	BEVATTNING ELLER DROPPBEVATTNING ¹⁾ 0,5–2,5 g/träd eller 0,5 kg–1 kg/ha	SPRIDNING MED POLLINERARE ²⁾ 300–500 g/ha vid blomningsstadium. Lägg dagligen ett tunt lager pulver i kupans spridningsanordning.	BESPRUTING AV VÄXTBESTÅND 5–7 kg/ha	BESPRUTING AV VÄXTBESTÅND 4 kg/ha	BESPRUTING AV VÄXTBESTÅND 300–500 g/ha

- 1) LALRISE VITA och LALRISE MAX WP kan blandas och spridas ut i samma tanklösning. Produktens användningsmängd enligt bruksanvisningen.
2) Prestop Mix sprids med bin eller humlor. Placera ut 2 bikupor försedda med en spridningsanordning per hektar.

Mer information om kompatibilitet från tillverkaren och försäljarna: www.verdera.fi
Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användningen.