



ANVÄNDNINGSPROGRAM
FÖR BIOLOGISKA PREPARAT
EXEMPEL

Verdera

JORDGUBBAR I TUNNEL OCH VÄXTHUS

PLANTERING	EFTER PLANTERING	VID BLOMNINGSTADIUM		
BEKÄMPNING AV ROTSJUKDOMAR	STIMULERING AV RÖTTER, TILLVÄXTFRÄMJANDE	GRÅMÖGEL (<i>Botrytis</i>)		STRESSFÖRHÅLLANDEN, FÖR EFFEKTIVARE NÄRINGSUPPTAG
LALSTOP® G46 WG <i>Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Phytophthora</i>	LALRISE® VITA	PRESTOP® MIX	LALSTOP® G46 WG	LALSTIM® OSMO
Behandla vid plantering, upprepa som genom bevattning 4 veckor efter plantering	Den första behandlingen 1–2 veckor efter plantering, upprepa behandlingen med 4 veckors mellanrum	Behandlingen påbörjas från början av blomningen	Från början av blomningen, upprepas efter 6–7 dagar	Behandla 24 h före stressförhållanden
INBLANDNING I SUBSTRAT ¹⁾ 20–50 g/m ³	MED BEVATTNING ³⁾ 200 g/1000 plantor	SPRIDNING MED POLLINERARE ⁴⁾ 300–500 g/ha under blomningen Lägg dagligen <u>ett tunt lager</u> pulver i kupans spridningsanordningen	BESPRUTNING AV VÄXTBESTÅND ⁵⁾ 250–300 g/ha (Besprutningsvolym 500–1000l/ha)	BESPRUTNING AV BLADVERK ⁵⁾ 2–4 kg /ha (Besprutningsvolym 250–1000 l/ha)
DOPP AV BARROTSPLANTOR ²⁾ 0,05 % vattenblandning				
BEVATTNING AV PLUGGPLANTOR ³⁾ 12,5 g/1000 plantor				
BEVATTNING/DROPPBEVATTNING ³⁾ 20–25 g/1000 plantor				

1) Blandas in i växtsubstratet som en vattenblandning, vattenmängden kan justeras efter behov.

2) Doppa plantorna i LALSTOP G46 WG-vattenlösningen så att rötterna och tillväxtpunkten väts överallt. 200 l av 0,05 % vattenlösning räcker till behandling av 10000 frigoplantor.

3) Vattenmängden kan justeras efter behov.

4) Prestop Mix sprids med bin eller humlor. Placera ut 2 bikupor försedda med en spridningsanordning per hektar. I växthus/tunnlar 1–2 humlekupor/1000 m².

5) LALSTOP G46 WG och LALSTIM OSMO kan blandas och sprutas ut i samma lösning.

Mer information om kompatibilitet från tillverkaren och försäljarna: www.verdera.fi

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användningen.



LALLEMAND PLANT CARE