



ANVÄNDNINGSPROGRAM
för biologiska preparat

EXEMPEL

Verdera

PRYDNADSVÄXTER

STICKLINGAR OCH PLUGGPLANTOR		EFTER KRUKNING				
BEKÄMPNING AV ROTSJUKDOMAR		STRESSFÖRHÅLLANDEN OCH TILLVÄXTSTIMULERING	GRÅMÖGEL <i>(Botrytis)</i>	BEKÄMPNING AV ROTSJUKDOMAR	STRESSFÖRHÅLLANDEN, FÖR EFFEKTIVARE NÄRINGSUPPTAG	
LALSTOP® G46 WG		LALSTIM® OSMO	LALSTOP® G46 WG	MYCOSTOP® <i>Fusarium, Pythium</i>	LALSTOP® G46 WG <i>Pythium, Fusarium, Rhizoctonia, Phytophthora</i>	LALSTIM® OSMO
Doppning av sticklingar/ pluggplantor före krukning	Inblandning i substrat eller bevattning av sådd eller pluggplantor	Den första behandlingen 24h före stressförhållanden	Den första behandlingen i samband med krukning, upprepa behandlingen med 3 veckors mellanrum	Den första behandlingen i samband med krukning, upprepa behandlingen med 4–6 veckors mellanrum		Den första behandlingen 24h före stressförhållanden
DOPPNING ¹⁾ 0,05 % vattenblandning (10 g/ 20 l vatten)	INBLANDNING I SUBSTRAT 20–50 g/m ³ BEVATTNING ³⁾ 0,5–1 g/m ²	BESPRUTNING ²⁾ 6 g/l	BESPRUTNING AV VÄXTBESTÅND ²⁾ 250–500 g/ha (Besprutningsvolym 500–2000 l/ha)	BEVATTNING ELLER UNDER-BEVATTNING ³⁾ 5–8 g/1000 plantor	BEVATTNING ELLER UNDER-BEVATTNING ³⁾ Enligt krukstorlek, 2–50 g/1000 plantor	BESPRUTNING AV BLADVERK ²⁾ 6 g/l

1) Doppa pluggplantor i en lösning av 0,05 % **LALSTOP G46 WG**, en snabb doppning på cirka en minut räcker.

2) **LALSTOP® G46 WG** ja **LALSTIM® OSMO** kan blandas och sprutas ut i samma lösning.

3) Vattenmängden kan justeras efter behov.

Mer information om kompatibilitet från tillverkaren och försäljarna: www.verdera.fi

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användningen.



LALLEMAND PLANT CARE