



PLANTUPPDRAGNING

EFTER PLANTERING

GRODDBRAND

ROTSJUKDOMAR

GRÅMÖGEL  
(*Botrytis*)  
TOMATKRÄFTA  
(*Didymella*)

STRESSTÅLIGHET,  
EFFEKTIVARE NÄRINGSUPPTAG

MYCOSTOP®

MYCOSTOP®  
*Fusarium, Pythium*

LALSTOP® G46 WG

LALSTIM® OSMO

Behandla direkt efter sådd eller  
plantuppkomst

Den första behandlingen i samband med  
plantering, upprepa behandlingen med 4–6  
veckors mellanrum

Den första behandlingen i samband  
med plantering. Upprepas med 3  
veckors mellanrum

Den första behandlingen 24 timmar  
före stressförhållanden. Upprepas med  
tre veckors mellanrum vid behov

BEVATTNING ELLER BESPRUTNING  
AV VÄXTUNDERLAG <sup>1)</sup>

2–10 g/100 m<sup>2</sup>

DROPPBEVATTNING, BEVATTNING AV  
VÄXTUNDERLAG ELLER BESPRUTNING <sup>1)</sup>

5–8 g/1000 plantor

BESPRUTNING AV VÄXTBESTÅND <sup>2)</sup>

250–500 g/ha  
(Besprutningsvolym 500–2000 l/ha)

BESPRUTNING AV BLADVERK <sup>2)</sup> eller  
DROPPBEVATTNING <sup>1)</sup>

(endast på stenull)  
2–3 kg/ha  
(Besprutningsvolym 400–1000 l/ha)

1) Vattenmängden kan justeras efter behov.

2) LALSTIM® OSMO och LALSTOP® G46 WG kan besprutas i samma lösning.

LALSTIM® OSMO kan ges på stenull med droppbevattning samtidigt med MYCOSTOP och LALSTOP® G46 WG.

Mer information om kompatibilitet från tillverkaren och försäljarna: [www.verdera.fi](http://www.verdera.fi)

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användningen.