



ANVÄNDNINGSPROGRAM
FÖR BIOLOGISKA PREPARAT
EXEMPEL

Verdera



VÄXTHUSGURKA

PLANTUPPDRIVNING

EFTER PLANTERING

GRODDBRAND

ROTSJUKDOMAR

SVARTPRICKRÖTA (*Didymella*) GRÅMÖGEL (*Botrytis*)

STRESSÅLIGHET, EFFEKTIVARE NÄRINGSUPPTAG

Torvblandningar:

MYCOSTOP®

Stenull:

LALSTOP® G46 WG

Torvblandningar:

MYCOSTOP®

Fusarium, Pythium

Stenull:

LALSTOP® G46 WG

*Pythium, Fusarium,
Rhizoctonia, Phytophthora*

LALSTOP® G46 WG

LALSTIM® OSMO

Behandla direkt efter sådd eller
plantuppkomst

Den första behandlingen i samband med
plantering, upprepa behandlingen med 4–6
veckors mellanrum

Den första behandlingen i
samband med plantering.
Upprepas med 3 veckors
mellanrum

Den första behandlingen 24
timmar före stressförhållanden.
Upprepas med tre veckors
mellanrum vid behov

BEVATTNING ELLER BESPRUTNING AV VÄXTUNDERLAG ¹⁾

DROPPBEVATTNING, BEVATTNING ELLER BESPRUTNING AV VÄXTUNDERLAG ¹⁾

BESPRUTNING AV VÄXTBESTÅND ²⁾

BESPRUTNING AV BLADVERK ²⁾ eller **DROPPBEVATTNING ¹⁾** (endast på stenull)

2–10 g/100 m²

0,5–1 g/m²

5–8 g/1000 plantor

20–25 g/1000 plantor

250–500 g/ha
(Besprutningsvolym 500–2000 l/ha)

2–3 kg/ha
(Besprutningsvolym 400–1000 l/ha)

1) Vattenmängden kan justeras efter behov.

2) **LALSTIM® OSMO** ja **LALSTOP® G46 WG** kan besprutas i samma lösning.

LALSTIM® OSMO kan ges på stenull med droppbevattning samtidigt med **MYCOSTOPIN** och **LALSTOP® G46 WG**.

Mer information om kompatibilitet från tillverkaren och försäljarna: www.verdera.fi

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användningen.



LALLEMAND PLANT CARE