

## MYCOSTOP®-biofungicidens kompatibilitet med olika växtskyddsmedel

MYCOSTOP® är ett biologisk växtskyddsmedel för bekämpning av rotsjukdomar orsakade av frö- och markburna sjukdomsalstrande svampar (t.ex. *Fusarium* och *Pythium*). Växtunderlaget kan behandlas med MYCOSTOP® t.ex. via droppbevattning eller produkten används för fröbetning samt för dopping. MYCOSTOP® innehåller strålbakterien *Streptomyces* K61 som, då den tillsätts i växtunderlaget, bebor växternas rötter och förhindrar angrepp av växtsjukdomar.

Rekommenderat behandlingsintervall har angetts i dygn.

Fungicider			
Verksam substans	Rekommenderat behandlingsintervall (dygn)	Verksam substans	Rekommenderat behandlingsintervall (dygn)
Azoxystrobin	0	Metalaxyl-M	0
Bupirimate	2	Oksatiapripolin	0
Cyazofamid	0	Oksatiapripolin + Metalaxyl-M (mefenoxam)	0
Fludioxonil	0	Propamokarb	0
Fosetyl-aluminium	0	Propamokarb + Fosetyl	0
Hymexazol	0	Pyraclostrobin	0
Imatzalil	2		

### Ozonvatten

MYCOSTOP® är kompatibel med ozonvatten (3ppm).  
(Högre koncentrationer har inte ännu testats)

### Insekticider

Insekticider som sprutas i bladverket påverkar inte MYCOSTOP® negativt eftersom preparaterna inte kommer i kontakt med varandra då behandlingen riktas mot olika delar av växten.

### Herbicider

Herbicider som sprutas i bladverket påverkar inte MYCOSTOP® negativt eftersom preparaten inte kommer i kontakt med varandra då behandlingen riktas mot olika delar av växten.

### Tillväxtregulatorer

MYCOSTOP® är kompatibel med tillväxtregulatorer som innehåller klormekvatklorid.

### Mikrobprodukter

Nyttomikrob	Rekommendation
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> QST 713	Kompatibel
<i>Bacillus thuringiensis</i>	Kompatibel
<i>Clonostachys rosea</i> J1446	Kompatibel
<i>Coniothyrium minitans</i> CON/M/91-08	Kompatibel
<i>Metarhizium brunneum</i> F52	Kompatibel
Andra mikrobprodukter, behandling i grogrund.	För att undvika konkurrens mellan olika mikrober rekommenderas ett behandlingsintervall av 7 dygn.

### Nyttoorganismer och nematoder

MYCOSTOP® kan användas samtidigt med nyttoorganismer och nematoder.

- Det rekommenderade behandlingsintervallet mellan MYCOSTOP® och verksamma substanser som inte nämns i denna tabell är 7 dygn.
- MYCOSTOP® får spridas i samma blandning som kompatibla växtskyddsmedel (0 dygn i tabellen). Blandningen måste i så fall användas så snart som möjligt efter tillblandningen.
- MYCOSTOP® lämpar sig ändå inte i tankblandningar med koncentrerade stamlösningar av gödsel- eller växtskyddsmedel.
- Betning med MYCOSTOP® rekommenderas inte till kemisk betat utsäde.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.