

Mycostop®

Taimipolteen torjuntaan ja siemenpeittaukseen

Taimipolteen aiheuttaj sienet (mm. *Pythium*, *Fusarium*, *Alternaria*) leviävät kasvualustan, siementen ja viljelytarvikkeiden mukana.

Taimipoltesienten esiintyminen kylvöksessä heikentää itämistä ja voi tuhota kasvit pian taimettumisen jälkeen. Tehokas ja luonnonmukainen tapa estää taimipolteen tuhot on käsitellä siemenet tai kylvökset biologisella Mycostop-valmisteella. Mycostop sisältää rahkaturpeesta eristettyä ja tarkoin valittua *Streptomyces*-sädebakteeria, jolla on laaja teho kasvualustan taudinaiheuttajia vastaan. Mycostop soveltuu vihannesten, yrttien ja koristekasvien taimikasvatukseen.



Peittaa siemenet Mycostop-jauheella: Laita tarvittava määrä Mycostop-jauhetta ja siemeniä kannelliseen astiaan. Ravistele kunnes jauhe on tarttunut siemeniin. Säilytä peitatut siemenet viileässä ja kylvä viikon kuluessa peittauksesta. Käytä kaalilla, sipulilla, purjolla ja maustekasveilla 8 g/1 kg siemeniä, salaattilla 2 g/1 kg siemeniä ja muilla lehtivihanneksilla, juureksilla, tomaatilla, paprikalla, kurkulla ja palkokasveilla 5 g/1 kg siemeniä. Käsittelyn voit uusaa kastelemalla taimet Mycostop-vesiseoksella (5-8 g/100 m²) juuri ennen istutusta.

Käsittele pikkutaimet Mycostop-vesiseoksella: Kastele tai ruiskuta kylvökset Mycostop-vesiseoksella heti taimettumisen jälkeen. Suositeltava käyttömäärä on 5-8 g/100 m². Sekoita Mycostop-jauhe ensin pieneen määrään kylmää vettä ja anna seistä noin 30 minuuttia. Sekoita huolellisesti ja laimenna lopulliseen käyttöväkevyyteen. Käytä kylvösten kasteluun 0,01 % vesiseosta (5 g Mycostop-jauhetta/50 l vettä) 50 litraa/100 m². Vaihtoehtoisesti vesimäärän voi säätää kastelutarpeen mukaan.

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.


Mycostop® on saatavilla 2 g, 5 g, 25 g, 50 g ja 100 g pakkauksissa. Tuote säilyy avaamattomassa pakkauksessa 12 kk viileässä, alle +4 °C:ssa säilytettynä. Soveltuu luomuviljelyyn ja integroituun kasvinsuojeluohjelmaan.

Mycostop-siemenpeittaus kukkakaalilla



Vas. *Alternaria*-taimipolte
Oik. *Alternaria*-taimipolte + Mycostop-peittaus

Mycostop *Fusarium*-taimipolteen torjunnassa



Ruohosipulin siementen luontaisessa *Fusarium*-saastunnassa Mycostop-kastelukäsittely (8 g/100 m²) paransi taimettumista ja lisäsi versojen tuorepainoa 20 %.